

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

-2-7-73 545602

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "BRETAGNE" Tél. RENNES (99) 36-01-74
(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)
Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux, Route de Fougères, RENNES
C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

////25//F 30 F

Supplément n° 1 au bulletin n° 153

27 juin 1973

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Les conditions climatiques actuellement très favorables à la maladie vont entraîner l'apparition de nouvelles taches dans les prochains jours.

Il est donc nécessaire de maintenir la protection des cultures par un nouveau traitement à effectuer dès réception de cet avis.

DORYPHORE

Il est recommandé d'examiner les cultures, surtout à proximité de la côte Sud, avant d'entreprendre le traitement contre le Mildiou afin, éventuellement, de lutter en même temps contre cet insecte au stade jeune larve. En cas de nécessité, ajouter alors à la bouillie fongicide l'un des produits indiqués dans le bulletin n° 150 de mars.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les sorties de papillons et les pontes étant nombreuses, une nouvelle intervention insecticide est nécessaire entre le 29 juin et le 2 juillet, de préférence au début de cette période.

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Profiter du traitement contre le carpocapse pour maintenir la protection contre la tavelure, bien que les risques deviennent très faibles pour les vergers sains.

PUCERONS DE L'ARTICHAUT

Compte-tenu de la présence du puceron noir, les drageons qui n'ont subi aucun traitement doivent impérativement être traités.

Par ailleurs, s'il ne pleut pas abondamment avant lundi (2 juillet), il sera alors nécessaire d'intervenir sur les cultures destinées à une première ou une deuxième récolte retardée (août à octobre).

Utiliser un insecticide rémanent du fait de la présence de pucerons ailés : l'Ométhoate (Folimat), à la rigueur le Diméthoate (nombreuses spécialités) ou le Formothion (Anthio). La quantité de bouillie à épandre doit au moins être égale à 1.000 l/ha pour s'assurer d'une bonne efficacité.

NOCTUELLES TOUTES CULTURES (Vers Gris)

Des dégâts sont actuellement observés dans diverses cultures, notamment sur maïs dans le Finistère. Pour la lutte, se référer à l'avis du 28 mai 1973.

Les Ingénieurs chargés
des Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"Bretagne"

G. PAITIER et G. CHARPENTIER

J. DELOUSTAL

Dernière note : Bulletin n° 153 du 7 juin 1973.